

SOBRE LA PIEL

Seguimiento de fauna en la
Reserva de la Biosfera de los
Valles de Omaña y Luna



Guille Castiñeira
Pau Cruz
Nuria Velasco

@omanayluna
@sosvencejos



DIPUTACIÓN
DE LEÓN



Valles de Omaña
RESERVA DE
LA BIOSFERA y Luna



RAPACES NOCTURNAS

5.1. Rapaces nocturnas

FAMILIA TYTONIDAE

Su nombre deriva de la palabra griega *tytō*, un tipo de lechuza nocturna.

Tan solo dos géneros, y ***Tyto*** es el único que mantiene representantes en España (una única especie).

Lechuza común o de campanario

(*Tyto alba*)



© Juan Varela

Lechuza común o de campanario

(*Tyto alba*)

Descripción: 35 cm, 300 g. Disco facial en forma de corazón. Ojos negros y pico color marfil. Patas largas, con tarsos emplumados. Plumaje varía desde el blanco puro hasta el dorado oscuro fuertemente moteado. Pollos cubiertos por plumón blanco; juvenil muy similar al adulto.



Autor: Anxo Fernández Villalobos



Hábitat: espacios abiertos. Cría en grietas y oquedades amplias. Muy ligada a las zonas humanizadas.


Lechuza común o de campanario

(*Tyto alba*)

Distribución: toda la Península Ibérica y en las islas.

Ejemplares reproductores ibéricos: *Tyto alba alba* (de color general blanco y levemente moteados). En invierno, aparece *T. a. guttata*.

Posible hibridación entre ambas subsp.



Fuente: SEO/BirdLife



Comportamiento: territorio fijo. Fases de actividad: tras puesta de sol y antes del amanecer. Caza desde algún posadero o percha, o mediante cernidos e inspecciones por el terreno con vuelo bajo. Siguen rutas regulares.


Lechuza común o de campanario

(*Tyto alba*)

Estatus de conservación

NT (casi amenazada, decreciente). Libro Rojo de las Aves de España.

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial




Fuente: SEO/BirdLife

5.1. Rapaces nocturnas

FAMILIA STRIGIDAE

En él se encuentra el género ***Strix***, primera especie del orden descrita (por Linneo en 1758), que da nombre al resto de taxones del grupo de rango superior (género tipo).

7 (8*) especies en España; 5 en la RBVOyL.



Cárabo común

(*Tyto alba*)



© Juan Varela



@omanayluna

Cárabo común

(*Tyto alba*)

Descripción: 40 cm, 600 g. Forma rechoncha, gran cabeza sin penachos. Plumaje muy críptico con diferentes coloraciones grises hasta rojizos, también intermedias. Alas cortas y anchas. Pico amarillo y ojos negros, con el borde del párpado rosado. Tarsos y dedos emplumados; uñas negras.



Autor: Guillermo Castiñeira Lera



Hábitat: fundamentalmente forestal. También en parques y jardines.

Cárabo común

(*Strix aluco*)

Distribución: en toda la Península Ibérica, *Strix aluco sylvatica*. Falta en islas.
Ceuta y Melilla: *S. a. mauritanica*.



Fuente: SEO/BirdLife



Autor: J. Alfonso Pérez Millán

Comportamiento: territorios pequeños y variables. Muy nocturno. Caza desde un posadero casi siempre.

Cárabo común

(*Strix aluco*)


Estatus de conservación

LC (preocupación menor, estable). Libro Rojo de las Aves de España.

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

PREOCUPACIÓN
MENOR

LC



Fuente: SEO/BirdLife

Búho chico

(Asio otus)



© Juan Varela

Búho chico

(*Asio otus*)

Descripción: 40 cm, 280 g. Grandes penachos desde pollo. Plumaje marrón y ojos naranjas. Rostro redondeado que puede cambiar ante amenazas, extendiendo los penachos. Pico y uñas negros. Similar al búho campestre.




Hábitat: bosquetes abiertos. Prefiere anidar en coníferas.

Búho chico

(*Asio otus*)

Distribución: en toda la Península Ibérica de forma discontinua, *Asio otus otus*. IncurSIONES de ejemplares norteños en inviernos duros.



Fuente: SEO/BirdLife



Autor: Guille Castiñeira

Comportamiento: ave muy silenciosa. Los territorios son variables. Muy nocturno. Caza en vuelos bajos. A veces forma dormideros en invierno.

Búho chico

(*Asio otus*)

Estatus de conservación

NT (preocupación menor, tendencia desconocida). Libro Rojo de las Aves de España.

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.



Fuente: SEO/BirdLife

PREOCUPACIÓN
MENOR

LC

Búho real

(*Bubo bubo*)



© Juan Varela

Búho real

(*Bubo bubo*)

Descripción: hasta 70 cm y 2,5 kg; 1,8 m de envergadura. Ojos naranjas y grandes penachos. Plumaje de tonos pardos. Tarsos y dedos emplumados. Pico y uñas negros.

Península Ibérica: *Bubo bubo hispanicus*, de menor tamaño.



Autor: Anxo Fernández Villalobos

Hábitat: roquedos, riscos, barrancos, cortados fluviales, etc. Territorios grandes de varios km².

Búho real

(*Bubo bubo*)

Distribución: en toda la Península, siendo más escaso en el norte. No está en las islas.



Fuente: SEO/BirdLife



Autor: Anxo Fernández Villalobos

Comportamiento: residente y muy territorial. Marcaje por canto desde posaderos que lo delimitan. Forma parejas estables.


Búho real

(*Bubo bubo*)

Estatus de conservación

LC (preocupación menor, creciente). Libro Rojo de las Aves de España.

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.



Fuente: SEO/BirdLife

PREOCUPACIÓN
MENOR

LC

Autillo europeo

(*Otus scops*)



© Juan Varela

Autillo europeo

(*Otus scops*)

Descripción: 20 cm, 100 g. Posee penachos y plumaje extraordinariamente críptico. Coloraciones intermedias entre gris y rojizo. Pico negro y ojos amarillo limón en adultos.



Autor: Guillermo Castiñeira Lera



Autor: Paul Cools

Hábitat: sotos fluviales, jardines y parques, evitando áreas forestales muy densas. Necesita áreas abiertas para cazar.

Autillo europeo

(*Otus scops*)

Distribución: en toda la Península y las islas. También se encuentra en las islas.



Fuente: SEO/BirdLife



Comportamiento: en general estival (migra al sur del Sáhara hasta los bosques ecuatoriales de África). Parte de los europeos podrían invernar al sur de España. Exclusivamente nocturno; caza desde posaderos.

Autillo europeo


(*Otus scops*)

Estatus de conservación

VU (vulnerable, decreciente). Libro Rojo de las Aves de España.

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

No aparece en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.



Fuente: SEO/BirdLife

VULNERABLE

VU

Mochuelo europeo

(*Athene noctua*)



© Juan Varela

Mochuelo europeo

(*Athene noctua*)

Descripción: 25 cm, 150 g. Sin penachos, disco facial poco definido y cejas blancas. Tarsos con plumaje blanco, dedos con "cerdas" grisáceas.



Autor: Anxo Fernández Villalobos

Hábitat: áreas de arbolado disperso (dehesas, olivares...) y zonas de cultivo. Evita bosques espesos y áreas montañosas.

Mochuelo europeo

(*Athene noctua*)

Distribución: *Athene noctua vidalii* está en toda la Península, evitando zonas de montaña. Islas: solo Mallorca.



Fuente: SEO/BirdLife



Autor: Anxo Fernández Villalobos

Comportamiento: hábitos diurnos y crepusculares. Fácil de ver al atardecer en los posaderos desde los que caza. Vuelo ondulante.

Mochuelo europeo


(*Athene noctua*)

Estatus de conservación

NT (casi amenazado, decreciente). Libro Rojo de las Aves de España.

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

CASI
AMENAZADO
NT



Fuente: SEO/BirdLife

5.1. Rapaces nocturnas

En rapaces nocturnas, hay 3 formas principales de detección:

- Cantos y reclamos.
- Egagrópilas.
- Plumas.



5.1. Rapaces nocturnas

Cantos y reclamos



- Todo el año.
- Áspero y ronco.
- Adultos en vuelo.
- Reclamo de los pollos en el nido.



- Todo el año.
- Típico ululato lastimero; sílabas largas y cortas.
- Reclamo de los pollos a mediados de primavera.



- Adultos muy silenciosos.
- Ululato grave, más corto que en búho real.
- Reclamo de los pollos a finales de primavera.



5.1. Rapaces nocturnas

Cantos y reclamos



- Todo el año.
- Ululato profundo de dos sílabas, al crepúsculo.
- Se puede oír a grandes distancias.
- Reclamo de los pollos en verano.



- Todo el año.
- Numerosas vocalizaciones que recuerdan al maullido de un gato.
- Muy ruidosos al crepúsculo, incluso de día.



- Primavera y verano.
- Ululato aflautado, muy similar al sonido que emite el sapo partero.
- Muy rítmico y repetitivo.
- Una sílaba.



5.1. Rapaces nocturnas

Plumas



- Mayor biblioteca online de plumas, llevada a cabo por coleccionistas de todo el mundo.
- Disponible para el público en general.
- Datos de casi 2000 especies.
- Recurso integral para identificar plumas, estudiar la diversidad de especies y comprender la biología de las aves.

5.1. Rapaces nocturnas

Plumas



Barbicelas en pluma de búho real
Autor: Javier G. Pérez

5.1. Rapaces nocturnas

Plumas



Tyto alba. Fuente: Featherbase.

5.1. Rapaces nocturnas

Plumas



Strix aluco. Fuente: Featherbase.